

## VOMISSEMENTS CHEZ LA FEMME ENCEINTE

### PRESCRIPTIONS

#### PRÉDOMINANCE DES VOMISSEMENTS MATINAUX PEU FRÉQUENTS

- SUCCINATE DE DOXYLAMINE 15.0 mg (NR)  
1 seule prise par jour le soir au coucher (max 2 par jour) qsp 5 jours seulement
- ⚠ L'Inconvénient est que l'indication retenue dans la notice d'utilisation est l'insomnie occasionnelle chez l'adulte. Il sera donc **nécessaire d'expliquer clairement à la patiente l'intérêt de la molécule de doxylamine dans les nausées.**

#### NAUSÉES ET VOMISSEMENTS RÉPARTIS DANS LA JOURNÉE

- SUCCINATE DE DOXYLAMINE 10 mg +  
CHLORHYDRATE DE PYRIDOXINE 10 mg  
J1 prendre 2 gélules au coucher et si pas d'effet au 3<sup>e</sup> jour prendre à J3 3 gélules (1 le matin et 2 les soir), si 3 gélules ne suffisent pas à J4 prendre 4 par jour (1 le matin, 1 milieu d'après midi et 2 le soir)
- 👉 Même si prescription plus complexe, l'avantage du Cariban est qu'il est bien précisé dans la notice d'utilisation l'indication de traitement des nausées et vomissements de la grossesse.

### SI PAS D'AMÉLIORATION AVEC CES PRODUITS

- METOPIMAZINE MICRONISÉE 7.5 mg  
2 à 4 lyophilisat oraux à répartir en 2 à 4 prises durée max de 5 jours, de préférence 15min avant les repas.
- 👉 ⚠ Possibilité d'effets secondaires à type de **symptômes extrapyramidaux** mais qui restent bien plus rares que ceux observés avec le métoclopramide chlorhydrate anhydre.
- ⚠ Désaccord CRAT & VIDAL : Information auprès du patient indispensable

### VIGILANCE


Céphalées
Fièvre
Douleurs abdominales
Contractions
HTA
Confusion
Convulsions

Rédaction par le Dr MIALHE Bernard,

Validé par le comité médical MEDADOM avec le Dr JOUVE Antoine, ANDRE Elies et MAILLET Florent