

VOMISSEMENTS / DIARRHÉES

PRESCRIPTIONS

GASTRO-ENTÉRITE (CONTEXTE VIRAL)

- DOMPERIDONE 10 mg - 1 comprimé avant les repas, 3 fois par jour si nausées ou vomissements,

☞ Prescrire la dompéridone avec prudence, surtout en cas de risques cardiovasculaires, d'insuffisance rénale ou hépatique.

- RACECADOTRIL 100 mg - 1 gélule avant les repas, 3 fois par jour si selles non moulées.

DIARRHÉES DU VOYAGEUR, TURISTA

- DOMPERIDONE 10 mg - 1 comprimé avant les repas, 3 fois par jour si nausées ou vomissements,
- RACECADOTRIL 100 mg - 1 gélule avant les repas, 3 fois par jour si selles non moulées,
- SOLUTION DE RÉHYDRATATION ORALE - 1 bouteille chaque 4 heures administrée en petites quantités si déshydratation

☞ Prescription de la coproculture avant introduction d'antibiothérapie si tableau clinique sans dysenterie, tableau brutal.

▶ **Traitement antibiotique uniquement en cas de forme sévère ou absence d'amélioration en 24 h :**

- AZITHROMYCINE PO : 1g en une prise.

A adapter selon les résultats de la coproculture

DIARRHÉES SOUS ANTIBIOTHÉRAPIE

- SOLUTION DE RÉHYDRATATION ORALE - 1 bouteille chaque 4 heures administrée en petites quantités si déshydratation

☞ En traitement symptomatique d'appoints de la diarrhée, et en complément des mesures

diététiques de réhydratation : des levures peuvent être prescrites afin de favoriser la restauration de la flore intestinale (ils sont non remboursés).

DIARRHÉE POST-ANTIBIOTIQUE À CLOSTRIDIUM DIFFICILE

☞ Prescription de la coproculture avec recherche de Clostridium dans les selles (PCR), et envoi aux urgences si résultat positif ou signe de mauvaise tolérance.

Traitement antibiotique de 1ère intention :

- Orienter le patient vers les urgences pour délivrance uniquement à la pharmacie centrale des hôpitaux.

A titre informatif :

- FIDAXOMICINE 200mg 2x/j pendant 10j
- VANCOMYCINE PO : 125 mg 4 fois/j pendant 10 jours

(▶ disponible à la pharmacie centrale des hôpitaux)

METRONIDAZOLE (pas en 1ère intention) n'a sa place qu'en cas d'indisponibilité des 2 traitements

DIARRHÉES PAR INTOXICATION ALIMENTAIRE (TIAC)

Maladie à déclaration obligatoire dès deux cas avérés, le CERFA est disponible sur le **canal #avis-médical dans l'onglet documents utiles de la plateforme slack** et est à envoyer rempli par mail à l'adresse suivante ☞ information-medicale@medadom.com.

✗ Toutes déclarations incomplètes ne peuvent être déclarées auprès de l'ARS.

Comment remplir le CERFA (encart médecin ou biologiste déclarant) :

- NOM + Prénom du médecin,
- NOM de l'établissement MEDIKSANTE auquel vous êtes rattaché (disponible sur votre contrat et sur vos ordonnances),
- FINESS MEDIKSANTE (disponible sur votre contrat et sur vos ordonnances),
- Téléphone support MEDADOM.

Traitement symptomatique

- SOLUTION DE RÉHYDRATATION ORALE - 1 bouteille chaque 4 heures administrée en petites quantités si déshydratation
- PHLOROGLUCINOL DIHYDRATE 160 mg - 2 lyophilisats au moment de la crise à renouveler après 2 heures. Maximum de 6 lyophilisats par 24 heures,

👉 Prescription de la coproculture avant introduction d'antibiothérapie si tableau clinique sans dysenterie, tableau brutal.

Traitement antibiotique seulement en cas de forme sévère ou d'absence d'amélioration en 24 heures :

- AZITHROMYCINE PO : 1 g en une prise.

VIGILANCE

Recherche du facteur déclencheur (repas, voyages, prise d'antibiotiques, comptage)

Syndrome dysentérique (présence de glaire et/ou de sang dans les selles)

Persistance des symptômes au delà des 48h

Signes de déshydratation (⚠️ nourrissons et enfants)

Hématémèse

Syndrome occlusifs



Rédaction par le Dr MIALHE Bernard,

Validé par le comité médical MEDADOM avec le Dr JOUVE Antoine, ANDRE Elies et MAILLET Florent

MEDADOM 
se connecter. se soigner.

Une question ?

**Vous pouvez nous contacter au
du lundi au vendredi de 9h à 19h30 par mail à l'adresse suivante information-medicale@medadom.com**

Edité le 01/08/2024 par MEDADOM